



Hỏi: Ớt bị thối trái, vết thối nhũn, mềm là bệnh gì ? Tại sao? biện pháp phòng trị?.

Đáp: Đây là bệnh thối trái ớt do vi khuẩn gây ra. Bệnh này xảy ra nặng trong mùa mưa. Vi khuẩn xâm nhập vào trái qua khí khẩu trên trái và nhứt là qua các vết thương do côn trùng cắn hoặc chích hút. Từ các vết này vi khuẩn chui vào trong và làm cho trái ớt bị thối.

Bệnh này rất khó trị. Cần áp dụng biện pháp ngừa bệnh sẽ có hiệu quả cao hơn:

- Không nên trồng ớt với mật độ quá dày.
- Cần giảm bớt lượng phân đạm bón cho cây, khi vườn ớt đã có bệnh xuất hiện. Nên bón thêm phân Kali (15 đến 30 Kg K₂O/ha) để giúp cây ớt chống chịu với bệnh.
- Không tưới vào sáng sớm và chiều mát. Vì tưới vào giai đoạn này sẽ kéo dài thời gian trái bị ướt, giúp cho vi khuẩn chui vào trái dễ hơn.
- Có thể dùng các loại thuốc trừ vi khuẩn để ngừa bệnh: Senly 2.1SL, Oxysulfate 80WP. Phun thuốc định kỳ mỗi 7 đến 10 ngày / lần khi vừa phát hiện ra bệnh. Ngưng phun thuốc 7 đến 10 ngày trước khi hái trái.
- Khi phát hiện ra vườn ớt có vài trái thối, phải lập tức hái các trái bệnh, mang ra khỏi vườn thật xa rồi đốt đi và tiến hành phun thuốc ngừa bệnh cho tất cả ớt trong vườn.
- Nên ngừa các loại côn trùng cắn phá hoặc chích hút, tạo vết thương để vi khuẩn chui vào gây bệnh.