

# BỌ TRĨ

*Baliothrips biformis* (bù lạch)

## 1. Đặc điểm hình thái:

- Trưởng thành màu nâu đen hoặc nâu đỏ, thon dài khoảng 1,5-2 mm. 2 cánh nhỏ, mang nhiều lông tơ.

Thành trùng linh hoạt, hoạt động mạnh lúc trời mát hoặc ban đêm, khi nắng chúng ẩn mình trong lá non hay phần chóp lá cuộn lại.

- Trứng: con cái thường đẻ trứng nơi đám lúa hoặc cỏ dại xanh tốt, trứng được đẻ vào đọt non. Trứng rất nhỏ, màu trắng trong, sắp nở có màu vàng.



- Bọ trĩ non rất nhỏ, hình dáng giống trưởng thành nhưng không có cánh, màu trắng vàng. sống tập trung nhiều con trên đọt non. Khi lá lúa xoè ra thì chúng di chuyển về phía chóp lá làm lá cuộn lại

## 2. Đặc điểm sinh học và quy luật phát sinh:

- Trứng đẻ rải rác trong mô lá, con non mới nở tập trung ở ngọn chích hút làm xoắn ngọn. Cả trưởng thành và non chích hút nhựa, mật độ cao làm cả ruộng khô táp. Thường phá thời kỳ mạ và đẻ nhánh, thời tiết khô hạn rất thuận tiện cho bọ trĩ phát triển.

Thời kỳ trứng 3- 5 ngày

Bọ trĩ non 10-14 ngày

Trưởng thành có thể sống 13- 19

Với mật số 1- 2 con/lá thì chóp lá có thể bị cuộn. 5 con/ lá thì chóp lá có thể bị cuộn 1- 3 cm. 10 con/lá thì chóp lá có thể bị cuộn hoàn toàn và héo khô.

### 1. Biện pháp phòng trị

- Tránh để ruộng khô hạn nhất là trong thời kỳ đầu vụ.

- Khi bị bọ trĩ tấn công thì chỉ cần bơm nước vào ruộng và chăm sóc cho lúa mau phục hồi (bón đạm hoặc phun phân bón lá), giúp cho lúa mau ra lá mới đền bù cho lá đã bị thiệt hại.

- Sử dụng thuốc:

+ *Mospha 80EC* : 0.3- 0.5 lít/ha

+ *Conphai 10WP* : 0.3 kg/ha