

SÂU CUỐN LÁ LỚN **(*Pamaraguttata Bremer*)**

1. Đặc điểm hình thái:

Trưởng thành màu tro đen, giữa cánh trước có 8 chấm trắng không đều nhau xếp hình vòng cung, cánh sau có 4 đốm nhỏ xếp thành hàng.

Sâu non có 6 tuổi, mới nở màu xanh lục, đầu màu đen, lớn dần có màu xanh lục, đầu màu nâu. Khi đầy sức có 4-7 đốt bụng mỗi bên, có một vạch trắng.

Nhộng màu vàng nhạt.

2 Đặc điểm sinh học

Trưởng thành vũ hoá buổi sáng, không ưa ánh sáng đèn, thích mật hoa. Trứng đẻ mặt sau lá, lúc đầu màu vàng nhạt sau xám đen. Mỗi bướm cái trung bình đẻ 120 trứng.

Sâu non mới nở nhả tơ dệt đầu mút lá tạo thành bao, tuổi lớn kết các lá gàn nhau thành bao lớn. Sâu non phá 10-15 lá, phá thời kỳ mạ- đẻ nhánh.

Làm nhộng trong bao hoặc giữa các khóm lúa.

Thời gian trứng: 4-5 ngày

Sâu non: 25-30 ngày

Nhộng: 6-10 ngày

Trưởng thành sống 4-5 ngày

Trên đồng ruộng còn có loài *P. mathias*. Trưởng thành màu tro đen, cánh trước có 8 đốm trắng nhỏ, sâu non màu xanh nhạt, đục, trên đầu có 2 vệt đỏ, nhộng xanh nhạt, đầu có gai nhọn.

Sử dụng thuốc phòng trị như đối với sâu cuốn lá nhỏ.