

# SÂU PHAO

(*Nymphula depunctalis*)

## 1. Đặc điểm hình thái:

Trưởng thành là bướm nhỏ mảnh, màu trắng tuyết, có những đốm nâu vàng nhạt ở 2 cánh.

Trứng tròn, vàng nhạt để thành 1-2 hàng.

Sâu non anh trong, đầu vàng nâu, 5 tuổi, dài khoảng 20mm khi đầy sức.

Nhộng nằm trong những phao lá màu vàng nâu gần gốc lúa.

## 2. Đặc điểm sinh học và qui luật phát sinh

Trưởng thành ưa ánh sáng đèn, trứng để thành hàng, mỗi ổ khoảng 20- 70 trứng, dưới mặt lá, ở những lá gần mặt nước. Một con cái đẻ 50- 100 trứng.

Sâu non sau khi nở cắn đứt đoạn lá khoảng 2cm cuộn tròn và sống trong đó để ăn chất xanh của lá và sau đó di chuyển để gây hại

Thời gian trứng: 2-6 ngày

Sâu non: 15-30 ngày

Nhộng: 6-7 ngày

Sâu thường phá lúa trên những ruộng có nhiều nước, nhất là vụ Hè Thu.

## 3. Biện pháp phòng trừ:

- Bảo tồn thiên địch, giảm tác hại của sâu.
- Chăm sóc lúa khoẻ giai đoạn đầu
- Đối với những ruộng bị nhiễm nên rút nước vài ngày, khi thấy sâu chết thì cho nước vào bình thường. Những ruộng không chủ động nước khi có mật số sâu cao có thể phun những loại thuốc sau:
  - + *Apphe 40EC* : 0.5- 0.6 lít/ha.
  - + *Losmine 250EC* : 0.3- 0.5 lít/ha